


## PROGRAMMA



## RAZIONALE

L'eiaculazione precoce e la disfunzione erettile sono patologie di ampia prevalenza, che compromettono la qualità di vita sessuale e generale del paziente e della coppia.

L'eiaculazione precoce in particolare è una patologia ampiamente sottodiagnosticata, che spesso non raggiunge un adeguato livello di medicalizzazione e viene vissuta nella coppia come una problema da tollerare necessariamente. L'approccio alla EP nella pratica clinica è spesso superficiale, fondandosi unicamente sull'anamnesi e sull'esclusione di ovvie patologie genitourinarie, infiammatorie o infettive, cui l'EP può essere secondaria.

Ciò accade nonostante le linee guida internazionali, prevedano un approccio multidimensionale alla diagnosi di EP mirato a valutare diversi aspetti, come lo Intravaginal Ejaculatory Time Latency (IELT), la percezioni di controllo, il distress e le difficoltà interpersonali correlate al disturbo eiaculatorio.

Il trattamento della EP è ancor più problematico, fondandosi spesso su presidi fisici o comportamentali di non dimostrata efficacia o farmaci off-label. Anche per questo, la EP è una patologia sottotrattata, in quanto a molti dei pazienti che ne sono affetti non viene proposto un regime terapeutico adeguato, o, nella migliore delle ipotesi, il trattamento prescritto sfugge spesso ad una corretta valutazione dei risultati, che porta medico e paziente a sottostimare l'impatto delle terapie farmacologiche ed a perdere motivazioni e fiducia nella possibilità di migliorare il problema.

La Disfunzione Erettile è una patologia ben più nota dell'eiaculazione precoce, e nel nostro paese si è fatta progressivamente strada, sia nel mondo sanitario che nell'opinione pubblica, l'opinione diffusa che esistano farmaci efficaci per trattarla. Tuttavia, dati scientifici e di mercato dimostrano come una significativa percentuale di pazienti con DE, sebbene responsivi al farmaco ed esenti da significativi effetti collaterali, abbandona il trattamento entro i primi sei mesi dalla prescrizione, dimostrando come vi siano dei bisogni terapeutici ancora insoddisfatti dalle attuali opzioni terapeutiche. L'introduzione in commercio di un nuovo farmaco per il trattamento della DE, l'avanafil, rappresenta l'occasione per valutare i punti di forza e, soprattutto, debolezza delle attuali strategie terapeutiche per la disfunzione erettile, alla luce anche della disponibilità di questa nuova molecola.

Obiettivo del corso è analizzare in modo critico processi diagnostici ed i modelli di management terapeutico della EP e della DE, al fine di ottimizzare le strategie terapeutiche e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questi due prevalenti disturbi della sfera sessuale maschile.



## SEDE E ORARIO DEL CORSO

SIU - Società Italiana Urologia  
Via Giovanni Amendola, 46  
00185 Roma

## COORDINATORE SCIENTIFICO

V. Mirone



La Società Italiana di Urologia è Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM) codice identificativo 221.

La Società Italiana di Urologia è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per Medici Chirurghi. La Società Italiana di Urologia si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi è **INDISPENSABILE** la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell'apprendimento.

Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Specializzazione accreditata: Urologia - Endocrinologia

Crediti ECM: 8

Iscrizione: la partecipazione al corso è gratuita e per 30 partecipanti.

## SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

SIU SERVICE s.r.l. - info@siu.it

Con il supporto incondizionato di:



# PROGETTO DEEP

APPROFONDIRE LE COMPETENZE  
NELLA GESTIONE CLINICA DELLA  
DISFUNZIONE ERETTILE E DELL' **EIACULAZIONE PRECOCE**

